

কখন সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার		কখন N95 মাস্ক ব্যবহার করবেন
যেখানে সরাসরি রোগীর সংস্পর্শ নেই এমন পরিবেশে	রোগীর নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ (১ মিটার বা ৩ ফুটের মধ্যে)	সম্ভাব্য এবং নিশ্চিত কোভিড ১৯ রোগীর এরোসল উৎপন্নকারী প্রক্রিয়া (AGP) চলাকালীন সময় উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা যেখানে এরোসল উৎপন্নকারী প্রক্রিয়া (AGP) চলমান যেমন আইসিউ
উদাহরণস্বরূপঃ রুম পরিষ্কার করার সময়, ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর রুম পরিষ্কারের সময়	উদাহরণ সরূপঃ সরাসরি রোগীর সেবাদানকারী, বাড়িতে এসে সেবাদানকারী, রোগী সনাক্তকারী, পরীক্ষাগারে যেমন রক্ত নেওয়া ইত্যাদি, ফিজিওথেরাপি দেওয়ার সময়	এরোসল উৎপন্নকারী প্রক্রিয়া (AGP) তালিকাঃ <ul style="list-style-type: none"> ইনটিউবেসন, এক্সটিউবেসন এবং এ সংস্পর্কিত প্রক্রিয়ার সময় ট্র্যাকিওস্টমি ব্রংকস্কোপি সার্জারি দাঁতের কাজ যেমন ড্রিলিং নন ইনভাসিভ ভেন্টিলেশন High Frequency Oscilating Ventilation (HFOV) Induction of Sputum
ব্যবহার্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীঃ সার্জিক্যাল মাস্ক, এবং পরিষ্কার করার সময় প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী	ব্যবহার্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীঃ <ul style="list-style-type: none"> সার্জিক্যাল মাস্ক এপ্রোন গ্লাভস গগলস 	ব্যবহার্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীঃ <ul style="list-style-type: none"> FFP3 বা N95 মাস্ক কজি পর্যন্ত লম্বা ডিজপোজেবল গাউন গ্লাভস ডিজপোজেবল গগলস
<ul style="list-style-type: none"> ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য ব্যবহার করতে হবে। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী অপসারণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হল- গ্লাভস, এপ্রোন বা গাউন, গগলস, হাত করা, সার্জিক্যাল বা N95 ফেস মাস্ক অপসারণ, হাত পরিষ্কার করা 		